

## Badania kontrolne po radykalnym leczeniu raka gruczołu krokowego

Badanie	Częstotliwość
Badanie podmiotowe, stężenie PSA	pierwszy rok po zakończeniu leczenia - co 3 miesiące, następnie co 6 mies. przez 2 lata, potem co 12 mies.
Badanie per rectum	Jak wyżej

### Uwagi:

- jednorazowe stwierdzenie wzrostu stężenia PSA powinno być zweryfikowane powtórным badaniem przed podjęciem decyzji o pogłębieniu diagnostyki w celu poszukiwania wznowy.
- Definicja nawrotu biochemicznego po radioterapii według ustaleń RTOG-ASTRO (Radiation Therapy Oncology Group — American Society for Radiation Oncology) z 2006 roku to wzrost stężenia PSA o 2 ng/ml powyżej osiągniętego najniższego stężenia
- gwałtowny wzrost PSA świadczy raczej o rozsiewie, natomiast późny, powolny wzrost przemawia bardziej za nawrotem miejscowym
- badanie per rectum jest szczególnie istotne u chorych z niezróżnicowanymi nowotworami lub w nowotworach niewywodzących się z tkanki gruczołowej stercza (np. Mięśaki), w przypadku których nie dochodzi do wzrostu PSA w trakcie progresji