

# **Badania kontrolne po radykalnym leczeniu raka jelita grubego**

(na podstawie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Onkologicznego)

## **1. Okrężnica:**

- badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz oznaczenie poziomu CEA co 3-6 m-cy przez 3 lata i co 6 m-cy przez kolejne 2 lata
- kolonoskopia w ciągu 1. roku obserwacji, następnie co 3-5 lat
- TK jamy brzusznej i klatki piersiowej co 6-12 m-cy przez 3 lata u chorych z dużym ryzykiem nawrotu:
  - \* II i wyższy stopień zaawansowania
  - \* cecha G3 w badaniu hist.-pat.
  - \* < niż 12 usuniętych węzłów chłonnych
  - \* perforacja
  - \* zabieg wykonywany w trybie pilnym (np. z powodu niedrożności)
  - \* inwazja naczyń

## **2. Odbytnica:**

- badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz oznaczenie poziomu CEA co 3-6 m-cy przez 3 lata i co 6 m-cy przez kolejne 2 lata
- kolonoskopia w ciągu 1. roku obserwacji, następnie co 5 lat
- rektosigmoidoskopia co 6 m-cy przez 2-5 lat
- TK jamy brzusznej, miednicy małej i klatki piersiowej co roku przez 3 lata

## **3. Kanał odbytu:**

- pierwsza ocena po 2 m-cach od zakończenia leczenia, następnie co 3 m-ce przez 3 lata, następnie co 6 m-cy przez kolejne 2 lata (zawsze z bad. per rectum i oceną pachwinowych węzłów chłonnych)
- u kobiet 1 raz w roku cytologia szyjki macicy
- w razie stwierdzenia wznowy konieczne pobranie wycinka, wykonanie TK jamy brzusznej i miednicy małej oraz rtg płuc