

# **Badania kontrolne po radykalnym leczeniu czerniaka**

(na podstawie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Onkologicznego)

1. **Czerniaki wczesne (stopnie IA-IB) po wycięciu ogniska pierwotnego bez przerzutów do węzłów chłonnych:**
  - badanie przedmiotowe i podmiotowe, zwłaszcza całej skóry i regionalnych węzłów chłonnych oraz okolicy blizny po wyciętym czerniaku co 6-12 m-cy przez 5 lat, następnie co 12 m-cy
  - rtg klatki piersiowej opcjonalnie
  - usg regionalnych węzłów chłonnych – gdy nie wykonano biopsji węzła wartowniczego w czerniaku > T1b (grubość nacieku < 1mm z owrzodzeniem lub indeks mitotyczny >1/mm<sup>2</sup>)
2. **Miejscowo zaawansowanie czerniaki (stopnie IIA-IIC) po wycięciu ogniska pierwotnego bez przerzutów do węzłów chłonnych:**
  - badanie przedmiotowe i podmiotowe, zwłaszcza całej skóry i regionalnych węzłów chłonnych oraz okolicy blizny po wyciętym czerniaku co 3-6 m-cy przez pierwsze 2-3 lata, następnie co 6-12 m-cy do 5 lat i co 12 m-cy po upływie 5 lat
  - rtg klatki piersiowej opcjonalnie
  - w stopniu IIB-IIC TK klatki piersiowej co 6-12 m-cy i raz w roku MR mózgu (przez pierwsze 3 lata)
3. **Po wycięciu przerzutów do okolicznych węzłów chłonnych lub miejscowej wznowy/ogniska satelitarnego (stopnie IIIA-IIIC):**
  - badanie przedmiotowe i podmiotowe (zwłaszcza całej skóry i regionalnych węzłów chłonnych oraz okolicy blizny po wyciętym czerniaku), rtg klatki piersiowej, morfologia krwi, LDH, próby wątrobowe, usg jamy brzusznej i okolicy po usuniętych węzłach chłonnych co 3 m-ce przez 2 lata, następnie co 3-6 m-cy przez kolejne 3 lata i co 12 m-cy po upływie 5 lat
  - TK klatki piersiowej i jamy brzusznej co 6-12 m-cy przez pierwsze 3 lata
  - MR mózgu co 12 m-cy przez pierwsze 3 lata
4. **Po leczeniu przerzutów odległych – badania obrazowe w zależności od lokalizacji mierzalnych ognisk oraz poziom LDH wg indywidualnego programu wizyt kontrolnych**