

## Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat 2000-2009 w podregionach woj. dolnośląskiego

Analizie poddano 109.725 dolnośląskich zachorowań na nowotwory złośliwe z lat 2000-2009, z pięcioletniej obserwacji stracone osoby 138 (0,1%).

Obliczono w pięcioletnich okresach 2000-2004 i 2005-2009 obserwowane i względne (uwzględniające wymieralność naturalną, różną ze względu na różne struktury wieku w podregionach) przeżycia 5-letnie.

Podział na te dwa okresy pozwolił zarówno porównać dane w podregionach z europejskimi (badanie EUROCORE-5 dla lat 2000-2007), jak i ocenić trendy zmiany wskaźników przeżyć względnych w dolnośląskich podregionach po pięciu latach.

**Tab.1 Mężczyźni, wszystkie nowotwory**

| Lata               | 2000-2004         |                         |                      | 2005-2009         |                         |                      | Zmiana       |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                    | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych |              |
| jeleniogórski      | 5255              | 28,4                    | <b>35,7</b>          | 5374              | 29,0                    | <b>35,3</b>          | <b>-0,4%</b> |
| legnicko-głogowski | 3656              | 28,8                    | <b>35,5</b>          | 4157              | 31,0                    | <b>37,1</b>          | <b>+1,6%</b> |
| wałbrzyski         | 6287              | 29,3                    | <b>36,9</b>          | 6807              | 30,2                    | <b>36,8</b>          | <b>-0,1%</b> |
| wrocławski         | 4360              | 28,8                    | <b>36,2</b>          | 5098              | 32,2                    | <b>38,9</b>          | <b>+2,7%</b> |
| miasto Wrocław     | 6321              | 34,4                    | <b>44,6</b>          | 7139              | 39,9                    | <b>50,0</b>          | <b>+5,4%</b> |

U dolnośląskich mężczyzn chorych na nowotwory złośliwe stwierdzamy duże różnice w wartościach wskaźnika względnych przeżyć, w mieście Wrocławiu w latach 2000-2004 i 2005-2009 wyniosły 44,6% i 50% i były o najmniej 7,7% w pierwszym okresie i 11,1% w drugim wyższe od stwierdzanych w pozostałych podregionach.

Także trend wzrostu wartości wskaźników był największy dla Wrocławia (+5,4%), w podregionach jeleniogórskim i wałbrzyskim stwierdziliśmy obniżenie wskaźnika.

EUROCORE-5 pokazuje dla Polski 35,4% przeżyć przy wartościach 50,3% dla EUROPY, w tym 39,3% dla Europy Wschodniej, ale 60%-64% dla Finlandii, Islandii, Austrii i Szwecji. Możemy więc powiedzieć, że w mieście Wrocławiu mamy średni europejski poziom wyleczalności nowotworów, w pozostałych podregionach średni dla Polski, ale poniżej wschodnioeuropejskiego.

**Tab 2. Kobiety, wszystkie nowotwory**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 5053              | 43,9                    | <b>50,7</b>          | 5678              | 46,7                    | <b>52,1</b>          | <b>+1,4%</b> |
| legnicko-głogowski | 3466              | 46,9                    | <b>53,2</b>          | 4000              | 48,0                    | <b>53,0</b>          | <b>+0,2%</b> |
| wałbrzyski         | 6269              | 43,2                    | <b>50,0</b>          | 7169              | 44,6                    | <b>50,2</b>          | <b>+0,2%</b> |
| wrocławski         | 3843              | 47,6                    | <b>54,7</b>          | 4862              | 51,0                    | <b>57,1</b>          | <b>+2,4%</b> |
| miasto Wrocław     | 6713              | 48,2                    | <b>56,2</b>          | 7614              | 51,5                    | <b>58,4</b>          | <b>+1,8%</b> |

U dolnośląskich kobiet także stwierdzamy różnice w wartościach wskaźnika przeżyć, w mieście Wrocławiu w latach 2000-2004 i 2005-2009 wyniosły 56,2% i 58,4% i były o 3,5% i 1,3% do 5% i 6,9% wyższe od stwierdzanych w pozostałych podregionach, z których podregion wrocławski wyróżniał się wysokimi wartościami wskaźników.


Także trend wzrostu wartości wskaźnika był największy dla podregionu wrocławskiego (+2,4%), najmniejszy wzrost, o 0,2% dotyczył wałbrzyskiego i legnicko-głogowskiego.

EUROCARE-5 pokazuje dla Polski 50,1% przeżyć przy wartościach 59,3% dla EUROPY w tym 53,7% dla Europy Wschodniej. Podobnie, jak u mężczyzn, w mieście Wrocławiu mamy średni europejski poziom wyleczalności nowotworów u kobiet, ale w podregionach wrocławskim i legnicko-głogowskim wschodnioeuropejski i w jeleniogórskim i wałbrzyskim najniższy, jednak średni dla Polski.

Znacznie wyższe wartości przeżyć od dolnośląskich – od 60% do 65% badanie EUROCARE-5 wykazało w aż czternastu krajach Europy.

Jednym z czynników różnicowania w podregionach wskaźników przeżyć 5-letnich były widoczne na poniższym wykresie różnice w zaawansowaniu nowotworów. Zarówno w okresie 2000-2004, jak i w 2005-2009 w podregionach jeleniogórskim, legnicko-głogowski i wałbrzyskim stwierdzamy mniejszy udział dobrze rokujących stadiów miejscowych nowotworów, niż w wrocławskim i Wrocławiu. Także widoczne w Tab. 1 i 2 wzrosty wartości wskaźników przeżyć w podregionach korelują z widocznymi na wykresie wzrostami udziału nowotworów w stadiach miejscowych w badanym okresie. We Wrocławiu był najmniejszy udział źle rokujących nowotworów w stadiach uogólnionych.

Wydaje się, że około 5%-we różnice w zaawansowaniu nie były jednak jedynym czynnikiem różnic w przeżyciach 5-letnich, które u mężczyzn sięgały kilkunastu procent. Drugim czynnikiem była prawdopodobnie dostępność leczenia onkologicznego, wymaga to odrębnego badania.



**Tab. 3 Kobiety nowotwory złośliwe piersi (C50 i D05)**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 955               | 69,5                    | <b>76,2</b>          | 1235              | 73,4                    | <b>78,5</b>          | <b>+2,3%</b> |
| legnicko-głogowski | 828               | 68,2                    | <b>74,1</b>          | 939               | 73,3                    | <b>78,1</b>          | <b>+4,0%</b> |
| wałbrzyski         | 1229              | 67,8                    | <b>74,3</b>          | 1515              | 70,4                    | <b>76,2</b>          | <b>+1,9%</b> |
| wrocławski         | 843               | 70,5                    | <b>76,8</b>          | 1121              | 75,5                    | <b>80,7</b>          | <b>+3,9%</b> |
| miasto Wrocław     | 1618              | 72,4                    | <b>80,3</b>          | 1855              | 76,2                    | <b>82,8</b>          | <b>+2,5%</b> |

W latach 2000-2004 wskaźnik przeżyć wynosił od 74,1% w podregionach wałbrzyskim i 74,2% w legnicko-głogowskim do 80,3% we Wrocławiu, a w 2005-2009 od 76,2% w wałbrzyskim do 82,8% we Wrocławiu.

Trend wzrostu wartości wskaźnika był największy dla podregionu legnicko-głogowskiego (+4%) i wrocławskiego (+3,9%). Jednocześnie udział nowotworów in situ w latach 2000-2004 i 2005-2009 w podregionie jeleniogórskim wynosił 1 i 5%, w legnicko-głogowskim po 5%, wałbrzyskim i wrocławskim 2 i 5% i we Wrocławiu 6 i 5%.

EUROCARE-5 stwierdzał dla Polski z lat 2000-2007 75,6% przeżyć przy wartościach 83,8% dla EUROPY w tym 75,8% dla Europy Wschodniej. W mieście Wrocławiu osiągamy średni europejski poziom wyleczalności nowotworów piersi u kobiet, ale w pozostałych podregionach niewiele przekraczał średni dla Polski, znacznie odbiegający od europejskiego.

Badanie EUROCARE-5 wykazało w większości krajów Europy Północnej, Południowej i Centralnej ponad 85% wyleczeń nowotworów złośliwych piersi, najwięcej w Finlandii, Francji i Islandii – ponad 88%.

**Tab. 4 Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61)**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 413               | 45,3                    | <b>61,9</b>          | 441               | 50,3                    | <b>63,9</b>          | <b>+2,0%</b> |
| legnicko-głogowski | 270               | 47,0                    | <b>63,9</b>          | 371               | 51,8                    | <b>64,7</b>          | <b>+0,8%</b> |
| wałbrzyski         | 565               | 50,9                    | <b>70,4</b>          | 659               | 53,1                    | <b>67,9</b>          | <b>-2,5%</b> |
| wrocławski         | 342               | 45,6                    | <b>64,2</b>          | 553               | 53,9                    | <b>69,6</b>          | <b>+5,4%</b> |
| miasto Wrocław     | 674               | 56,5                    | <b>78,2</b>          | 1078              | 65,7                    | <b>84,3</b>          | <b>+6,1%</b> |

Stwierdzamy bardzo duże różnice w wartościach wskaźnika względnych przeżyć chorych na nowotwory prostaty. W mieście Wrocławiu w latach 2000-2004 i 2005-2009 wyniosły 78,2% i 84,3% i były od 7,8% do 20,4% wyższe od stwierdzanych w pozostałych podregionach.

Trend wzrostu wartości wskaźników był największy dla Wrocławia (+6,1%) i w podregionie wrocławskim (+5,4%), w podregionie wałbrzyskim stwierdzamy obniżenie wskaźnika o 2,5%.

EUROCARE-5 pokazuje dla Polski 67,1% przeżyć przy wartościach 84% dla EUROPY w tym 72,2% dla Europy Wschodniej. W mieście Wrocławiu w latach 2005-2009 osiągnięto średni europejski poziom wyleczalności nowotworów prostaty, w pozostałych podregionach średni dla Polski, ale poniżej wschodnioeuropejskiego.

We Francji, Belgii, Finlandii, Niemczech i Francji badanie EURO CARE-5 stwierdziło 90-92% 5-letnich przeżyć względnych.

**Tab. 5 Nowotwory złośliwe jelita grubego (C18-C20), obie płci**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 1059              | 34,3                    | <b>43,3</b>          | 1286              | 39,8                    | <b>48,1</b>          | <b>+4,8%</b> |
| legnicko-głogowski | 806               | 38,1                    | <b>46,9</b>          | 953               | 37,4                    | <b>44,2</b>          | <b>-2,7%</b> |
| wałbrzyski         | 1370              | 35,9                    | <b>45,0</b>          | 1652              | 38,4                    | <b>46,0</b>          | <b>+1,0%</b> |
| wrocławski         | 857               | 40,0                    | <b>49,4</b>          | 1057              | 39,9                    | <b>47,6</b>          | <b>-1,8%</b> |
| miasto Wrocław     | 1451              | 38,7                    | <b>49,4</b>          | 1603              | 43,3                    | <b>53,2</b>          | <b>+3,8%</b> |

Średnia europejska wskaźnika przeżyć w latach 2000-2007 to 55,3%, wschodnioeuropejska 47,1, a polska 45,7%. W latach 2005-2009 wartość dla podregionu legnicko-głogowskiego była poniżej wszystkich trzech powyższych wartości, dla miasta Wrocławia większa od polskiej, ale mniejsza od europejskiej, dla pozostałych podregionów na poziomie wschodnioeuropejskim.

W Szwecji, Szwajcarii, Belgii, Niemczech i Islandii osiągnięto dla nowotworów kolorektalnych ponad 60% przeżyć.

**Tab. 6 Czerniak złośliwy skóry(C43), obie płci**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 111               | 47,7                    | <b>55,7</b>          | 189               | 47,1                    | <b>53,7</b>          | <b>-2,0%</b> |
| legnicko-głogowski | 69                | 44,9                    | <b>51,4</b>          | 116               | 46,6                    | <b>53,4</b>          | <b>+3,0%</b> |
| wałbrzyski         | 175               | 50,3                    | <b>57,4</b>          | 225               | 55,1                    | <b>62,3</b>          | <b>+4,9%</b> |
| wrocławski         | 127               | 55,1                    | <b>62,5</b>          | 184               | 62,0                    | <b>68,1</b>          | <b>+5,6%</b> |
| miasto Wrocław     | 238               | 58,8                    | <b>68,4</b>          | 182               | 62,0                    | <b>68,1</b>          | <b>-0,3%</b> |

Wskaźnik pięcioletnich przeżyć względnych chorych z lat 2005-2009 osiągał wartość od 53,4 i 53,7 % w podregionach legnicko-głogowskim i jeleniogórskim do 68,1% w wrocławskim i mieście Wrocławiu. Wartości te były znacznie niższe, niż stwierdzane w Europie, tylko w pięciu krajach w badaniu EURO CARE-5 stwierdzono wartości mniejsze, niż 80% przeżyć: w Bułgarii 48,5%, Polsce 60,7%, Słowacji 74,4% i Portugalii 79,7%.

W Islandii i Irlandii Północnej osiągnięto 90% przeżyć 5-letnich.

**Tab. 7 Nowotwory złośliwe głowy i szyi (C00-C14, C30-C33), obie płci**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 615               | 44,6                    | <b>50,3</b>          | 633               | 46,4                    | <b>51,1</b>          | <b>+0,8%</b> |
| legnicko-głogowski | 416               | 45,4                    | <b>51,1</b>          | 465               | 47,5                    | <b>52,2</b>          | <b>+1,1%</b> |
| wałbrzyski         | 745               | 43,6                    | <b>50,0</b>          | 747               | 44,2                    | <b>49,3</b>          | <b>-0,7%</b> |
| wrocławski         | 497               | 41,2                    | <b>47,0</b>          | 521               | 43,8                    | <b>48,2</b>          | <b>+1,2%</b> |
| miasto Wrocław     | 578               | 46,5                    | <b>53,6</b>          | 636               | 49,2                    | <b>55,5</b>          | <b>+1,9%</b> |

W latach 2000-2004 odnotowaliśmy od 47 do 53,6% przeżyć, a w 2005-2009 48,2 do 55,5%. Największy wzrost wartości wskaźnika, stwierdzamy w mieście Wrocławiu, o 1,9%.

Podawane w EUROCARE-5 wartości dla „Head and Neck” są znacznie niższe: dla Europy Wschodniej 26,8%, dla Polski 32% i dla całej Europy 41,4%. Najwyższe wartości – powyżej 50% przeżyć podawane są dla Islandii, Malty, Holandii i trzech państw Półwyspu Skandynawskiego.

**Tab. 8 Rak szyjki macicy (C53 i D06)**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 392               | 52,8                    | <b>55,8</b>          | 418               | 57,2                    | <b>60,3</b>          | <b>+4,5%</b> |
| legnicko-głogowski | 205               | 54,1                    | <b>57,0</b>          | 266               | 57,5                    | <b>60,4</b>          | <b>+3,4%</b> |
| wałbrzyski         | 370               | 47,6                    | <b>50,3</b>          | 345               | 49,3                    | <b>52,4</b>          | <b>+2,1%</b> |
| wrocławski         | 236               | 53,8                    | <b>56,9</b>          | 282               | 60,6                    | <b>63,8</b>          | <b>+6,9%</b> |
| miasto Wrocław     | 323               | 53,3                    | <b>56,5</b>          | 385               | 60,3                    | <b>64,0</b>          | <b>+7,5%</b> |

EUROCARE-5 podaje dla Europy wschodniej 60,3% przeżyć, w tym dla Polski 55,2%. Niższą wartość wskaźnika stwierdzamy w podregionie wałbrzyskim, w pozostałych wartości w latach 2005-2009 były równe, lub powyżej poziomu wschodnioeuropejskiego. W sześciu krajach – Belgii, Holandii, Danii, Słowenii Norwegii i Północnej Irlandii wskaźnik przeżyć osiąga 70-75%, dla Islandii nawet 84,6%.

W tabeli 8 zwraca uwagę znaczna poprawa wartości wskaźników przeżyć w porównaniu z chorymi z lat 2000-2004.

Jak pokazuje poniższa tabela 9 dotycząca tylko raków inwazyjnych C53 – poprawa przeżywalności jest wyłącznie wynikiem wzrostu wykrywanych raków przedinwazyjnych D06. Wynikało to prawdopodobnie z wdrożeniem od 2006 roku ministerialnego przesiewu raka szyjki macicy. W latach 2000-2004 raki in situ stanowiły 2-6% wszystkich zachorowań, a w 2005-2009 od 11% w podregionie wałbrzyskim do 24% w wrocławskim i mieście Wrocławiu.

Tabela 9 pokazuje, że wyniki leczenia inwazyjnych raków szyjki C53 pogorszyły się we wszystkich podregionach Dolnego Śląska.

**Tab. 9 Inwazyjny rak szyjki macicy (C53)**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 369               | 50,4                    | <b>54,5</b>          | 336               | 47,3                    | <b>50,4</b>          | <b>-4,1%</b> |
| legnicko-głogowski | 199               | 53,8                    | <b>57,7</b>          | 220               | 48,6                    | <b>51,5</b>          | <b>-6,2%</b> |
| wałbrzyski         | 360               | 46,3                    | <b>50,3</b>          | 307               | 43,6                    | <b>46,7</b>          | <b>-3,6%</b> |
| wrocławski         | 225               | 53,0                    | <b>56,3</b>          | 214               | 49,1                    | <b>52,3</b>          | <b>-4,0%</b> |
| miasto Wrocław     | 317               | 52,7                    | <b>57,2</b>          | 293               | 50,5                    | <b>54,4</b>          | <b>-2,8%</b> |

**Tab. 10 Nowotwory trzonu macicy macicy (C54)**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 304               | 68,8                    | <b>74,3</b>          | 382               | 70,7                    | <b>79,2</b>          | <b>+4,9%</b> |
| legnicko-głogowski | 189               | 70,4                    | <b>75,7</b>          | 264               | 69,3                    | <b>76,5</b>          | <b>+0,8%</b> |
| wałbrzyski         | 391               | 67,5                    | <b>73,0</b>          | 502               | 67,9                    | <b>77,3</b>          | <b>+4,3%</b> |
| wrocławski         | 242               | 68,6                    | <b>73,7</b>          | 334               | 68,0                    | <b>76,2</b>          | <b>+2,5%</b> |
| miasto Wrocław     | 379               | 71,8                    | <b>78,2</b>          | 441               | 69,6                    | <b>79,6</b>          | <b>+1,4%</b> |

W latach 2005-2009 w porównaniu z poprzednim pięcioleciem wartości wskaźników przeżyć uległy we wszystkich podregionach wzrostowi z 73-78,2% do 76,2-79,6%.

Były one porównywalne z podawanymi przez EUROCCARE-5 dla Polski (75,7%), Europy wschodniej (76,6%), czy całej Europy (77,6%).

Najwyższe wartości wskaźników przeżyć chorych na nowotwory trzonu macicy w Europie stwierdzono w Norwegii, Finlandii i Szwecji (83,5-85,2%).

**Tab. 11 Nowotwory złośliwe jajnika (C56), kobiety**

| Lata               |                   | 2000-2004               |                      |                   | 2005-2009               |                      |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Podregion          | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Liczba zachorowań | % przeżyć obserwowanych | % przeżyć względnych | Zmiana       |
| jeleniogórski      | 268               | 37,3                    | <b>41,3</b>          | 294               | 37,1                    | <b>40,4</b>          | <b>-0,9%</b> |
| legnicko-głogowski | 226               | 42,0                    | <b>45,7</b>          | 202               | 40,6                    | <b>43,9</b>          | <b>-1,8%</b> |
| wałbrzyski         | 384               | 39,8                    | <b>44,1</b>          | 328               | 35,1                    | <b>38,1</b>          | <b>-6,0%</b> |
| wrocławski         | 227               | 40,5                    | <b>44,3</b>          | 223               | 42,2                    | <b>45,6</b>          | <b>+1,3%</b> |
| miasto Wrocław     | 341               | 38,4                    | <b>42,5</b>          | 359               | 39,8                    | <b>43,6</b>          | <b>+1,1%</b> |

Dla zachorowań na raka jajnika z lat 2000-2007 z Europy EUROCCARE-5 podaje 40,8% przeżyć względnych, dla Polski 42%. Najwyższe wartości wskazano dla Finlandii, Szwecji i Portugalii – 46,5 – 47,1%. Osiągane w podregionach woj. dolnośląskiego wartości przeżyć są więc na poziomie europejskim.

## Wnioski

1. Zdecydowanie najwyższe wartości 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory złośliwe z lat 2005-2009 stwierdziliśmy w podregionie miasto Wrocław. U mężczyzn były one wyższe o od 11 do 15% od stwierdzanych w pozostałych czterech podregionach, u kobiet o 1% wyższe, niż w podregionie wrocławskim, ale o 5-8% od stwierdzanych w pozostałych trzech podregionach. Wydaje się, że na to zróżnicowanie przeżyć prócz różnic w zaawansowaniu wpływa przede wszystkim bliskość, więc także łatwa dostępność do ośrodków onkologicznego, pulmonologicznego oraz ginekologii i urologii we Wrocławiu.
2. W latach 2005-2009 w porównaniu z latami 2000-2004 najwyższe wzrosty wartości przeżyć 5-letnich stwierdziliśmy we Wrocławiu (o +5,4% u mężczyzn i +1,8% u kobiet) oraz w podregionie wrocławskim (+2,7% i +2,4%). W pozostałych podregionach obliczony trend wyniósł od -0,4% do +1,4% i nie wskazywał na polepszenie wyleczalności nowotworów.



3. Porównanie z wynikami badania EUROCORE-5 pokazało, że najbardziej odbiegamy od Europy w przeżyciach chorych na czerniaka złośliwego skóry, wartości przeżyć chorych z lat 2005-2009 wyniosły w dolnośląskich podregionach od 53 do 68%, podczas, gdy w Europie wartości mniejsze, niż 80% przeżyć stwierdzono tylko w Bułgarii 48,5%, Polsce 60,7%, Słowacji 74,4% i Portugalii 79,7%.
4. Dla chorych na nowotwory głowy i szyi z lat 2005-2009 w pięciu podregionach dolnośląskich stwierdziliśmy od 48,2% do 55,5% 5-letnich przeżyć względnych i były to wartości znacznie wyższe, niż w Europie. Podawane w badaniu EUROCORE-5 wartości dla „Head and Neck” wynosiły dla Europy Wschodniej 26,8%, dla Polski 32% i dla całej Europy 41,4%. Wartości powyżej 50% przeżyć podawane były tylko dla Islandii, Malty, Holandii i trzech państw Półwyspu Skandynawskiego.